

活動性假牙製作前說明事項

親愛的長者，很高興您申請縣府補助的活動假牙製作，在製作前先跟您說明一些注意事項，讓您對活動假牙製作過程有所了解，若有不明白的地方，請務必向您的主治醫師詢問清楚，以讓您的活動假牙製作過程順利，而有滿意的配戴效果。

1. 活動性假牙包括局部活動假牙(RPD)和全口活動假牙(CD)，其材質為醫療用的壓克力樹脂製作而成。拿下來的時候小心握住，不可以摔落地面，以及重咬硬物，否則會造成破裂損壞，因為人為疏失造成的破損，修補時需再支付費用。
2. 活動性假牙，主要是靠剩餘的齒槽骨和黏膜組織來支撐，所以齒槽骨的條件相對重要。每個人的齒槽骨條件不同，製作出來的活動假牙咬合效果也不同。製作前必須由醫師做全口評估，可保留的牙齒儘量保留，不能留存的牙齒必須先拔除。製作過程約視個人狀況不同，需多次的約診，請耐心接受約診處理。
3. 欲保留的牙齒如果蛀牙太嚴重，必須先作齲齒填補或根管治療，有可能要作固定牙冠(crown)保護，才可以避免破裂或再蛀牙，才能夠承受活動假牙的鉤靠。(固定牙冠 crown 須另行支付費用)
4. 決定保留的牙根，必須先做根管治療，之後填補或做根柱覆蓋體(coping)，以保護牙根。(根柱覆蓋體 coping 費用必須另行支付)
5. 拔完牙齒的地方，必須讓傷口癒合復原及齒槽骨生長，一般等待時間約 1~3 個月，才能夠開始製作活動假牙，此段時間若需要的話，可以製作臨時活動假牙，暫時維持美觀及基本的咬合。(臨時活動假牙必須自費)
6. 若傷口癒合復原後，齒槽骨若不能自行吸收平整，有尖銳齒槽突起，則必須再施行齒槽骨修整術，否則活動假牙配戴後會造成壓痛的問題。
7. 如果條件太差而造成假牙不穩定，則初期配戴時，會造成壓痛或不適應，必須有耐心回診多次調整，若經多次調整，效果還是不好，則必須借助假牙黏著劑或做成植牙連結體加覆蓋式活動假牙來穩定假牙，其費用必須另行支付。
8. 局部活動假牙(RPD)必須借助剩餘健康的牙齒來鉤靠穩定假牙，若鉤靠的牙齒缺損太厲害，則必須另外製作固定牙冠或牙橋來保護它，其費用不包括在活動假牙內，須另行支付費用。
9. 活動性假牙的使用壽命因人而異，主要是看齒槽骨日後的吸收程度快慢，如果吸收程度太大，造成假牙底部和口腔黏膜貼合不良，則必須換底或重新製作假牙，其費用必須另行支付。
10. 活動性假牙咀嚼時，假牙會些微晃動是正常的。
11. 全口假牙(CD)咀嚼時必須兩側同時咬，並不建議使用前牙作切咬或單側咬合，會造成假牙容易脫落。
12. 活動性假牙極易堆積食物殘屑，吃完食物後，必須拿下來清潔乾淨。
13. 初戴時會有口齒不清或咬傷舌頭臉頰等現象，經過一段時間調整適應後就會恢復正常。
14. 若是之前已經有戴過活動假牙的經驗，再製作新的活動假牙，新舊假牙配戴的感覺必然不同，必須重新適應。
15. 活動性假牙的保存，清潔後放在專用保存盒內以清水加清潔錠浸泡消毒，勿隨便放置或用熱水鹽水浸泡，否則會造成假牙變形腐蝕或遺失。
16. 活動假牙必須每天配戴，太久時間沒有配戴，組織變動後便戴不回去了，有可能要重做。重作費用必須另行支付。
17. 裝戴假牙後，須每半年回診檢查調整。